

AgroVit® PeP^{Plus} Elektrolyt

Diætetisk tilskudsfoder

- tilsat naturligt E-vitamin, A, D, og C-vitamin + B-vitamin kompleks og smag

Til kalve og smågrise med fordøjelsesforstyrrelser

- Stabiliserer væske- og elektrolytbalancen
 - Indeholder overvejende elektrolytter og let opløselige kulhydrater
 - Anvend **AgroVit® PeP^{Plus} Elektrolyt** hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelighedsforstyrrelser (diarré).
- Anvend **AgroVit® PeP^{Plus} Elektrolyt** hvor elektrolytvand anvendes som "velkomstdrik" til ny-indsatte kalve eller smågrise som er i en stress situation.
 - Hvis elektrolytter anvendes i varme perioder for at opretholde væskebalancen eller blot som energitilskud, er den almindelige **AgroVit® PeP Elektrolyt** fuldt tilstrækkeligt.

Tildeling:

Kalve:

Ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser gives 2-3 liter **AgroVit® PeP^{Plus} Elektrolytopløsning** 2-3 gange daglig. De efterfølgende 2 dage kan der gives halv mælkemængde og tilsvarende mindre elektrolytopløsning. (Samtidig fodring med mælk bør undgås ved løbemave). Ved nyindsatte kalve kan der tildeles elektrolytopløsning umiddelbart efter indsætning, samt som "mellemmåltid" mellem 1. og 2. mælketildeling. **AgroVit® PeP^{Plus} Elektrolyt** bør ikke blandes med mælk eller mælkeerstatning, men bør gives mindst 1 time før mælkefodring.

Smågrise:

Ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser tildeles **AgroVit® PeP^{Plus} Elektrolytopløsningen** fra et rent trug eller en automat. Risikoen er størst ved 3 ugers alderen efter fravæning og hos indkøbte smågrise. Grisene bør have fri adgang til elektrolytopløsningen ved fordøjelsesforstyrrelser. Der tildeles 1-5 liter elektrolytopløsning pr. kuld pr. dag afhængig af antallet af grise og deres alder. **AgroVit® PeP^{Plus} Elektrolyt** bør ikke blandes med en mælkeerstatning, der er tilsat syre.

Brugsanvisning:

Fremstilling af elektrolytopløsning:

1 mål (ca. 160 gram) **AgroVit® PeP^{Plus} Elektrolyt** opløses i 5 liter varmt vand (ca. 40° C). Koncentrationen skal overholdes. I modsat fald kan elektrolytopløsningen virke imod hensigten.

Anbefalet brugsperiode: 1-7 dage

Såfremt der ikke gives andet foder: 1-3 dage

Råvarer:

Dextrose (druesukker), natriumbicarbonat, natriumklorid, kaliumklorid og kalciumkarbonat.

Indholdsgaranti:

Råprotein	0,0%
Råfedt	0,0%
Træstof	0,0%
Råaske	27,4%
Natrium	8,8%
Kalium	3,0%
Klorid	9,6%

Tilsætningsstoffer pr kg:

Vitamin A (3a672a):	100.000ie
Vitamin D (E671):	10.000ie
Vitamin E RRR alpha tocoferyl acetat (3a700):	300mg*
Vitamin B1 (3a821):	45mg
Vitamin B2 (riboflavin):	90mg
Pantothensyre (3a841):	353mg
Kolin klorid (3a890):	550mg
Niacin (3a315):	650mg
Vitamin B6 (3a831):	70mg
Folinsyre (3a316):	35mg
Vitamin B12(cyanocobalamin):	250mcg
Vitamin C (3a300):	3.200mg
Biotin (3a880):	5.000mcg

*300mg RRR alpha tocoferyl acetat svarer til 408 ie E-vitamin i naturlig form.

Emballage:

Sæk á 15 kg

Opbevaring:

Tørt og tillukket (Bør lukkes omhyggeligt efter brug)

Holdbarhed:

12 måneder efter fremstilling



Thorkild Kallestrup
Produktkonsulent, kvæg
+45 2028 7103
tk@mosegarden.dk

Morten Bredkjær
Produktkonsulent, svin
+45 2185 1966
mb@mosegarden.dk

